

## Encefalitis Centro-Europea

### ¿Qué es la Encefalitis Centro-Europea?

Es una enfermedad producida por un virus que afecta al sistema nervioso central. Los síntomas, en un principio, son similares a los de la gripe, pudiendo evolucionar a parálisis, y en ocasiones dejar secuelas permanentes o dar lugar al fallecimiento.

### ¿Cómo se adquiere?

Se adquiere a través de la picadura de garrapatas infectadas. También se puede transmitir a través de la leche cruda infectada no higienizada. No existe transmisión directa de persona a persona.

### ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad?

Evitando las picaduras de garrapatas usando pantalones largos y calzado cerrado preferentemente si se hace camping o excursiones en zonas endémicas. En algunos casos puede estar indicada la vacunación

### ¿Dónde hay riesgo?

La enfermedad esta presente, principalmente en los meses de verano y en las zonas rurales y boscosas, en zonas de Europa, especialmente en Alemania, Austria, Bielorusia, Eslovaquia, Estados Bálticos, Federación Rusa, Hungría, Polonia República Checa, Suiza, Ucrania (ver mapa).



# Vacuna Encefalitis Centro-Europea

## ¿Quién debe vacunarse?

Los viajeros (cazadores, excursionistas,...) que caminen o acampen en zonas infestadas entre primavera y principios del otoño. La indicación personalizada debe realizarse en un Centro de Vacunación Internacional

## ¿Dónde me puedo vacunar?

En los Centros de Vacunación Internacional.

## ¿Cuándo debo vacunarme?

Iniciar la vacunación dos meses antes del viaje

## ¿Cuántas dosis son necesarias?

Tres dosis por vía intramuscular, las dos primeras dosis se administran con un intervalo de 4-12 semanas y la tercera a los 9-12 meses de la segunda dosis. Se puede seguir una pauta rápida, que debe ser valorada por el médico.

## ¿Dosis de recuerdo?

Cada 3 años sí continua el riesgo.

## ¿Quién no debe vacunarse?

Como norma general las personas que presenten problemas médicos que contraindiquen la administración de esta vacuna o hubieran presentado reacciones adversas a dosis anteriores de la vacuna.

## ¿Que reacciones pueden presentarse?

Ocasionalmente reacciones locales leves, como enrojecimiento, hinchazón y dolor en el lugar de la inoculación, pudiendo aparecer en raras ocasiones fiebre, náuseas, vómitos, dolor muscular o articular.

**«Se recuerda que si es picado por una garrapata es necesario que le sea extraída inmediatamente por personal entrenado para ello «**

Consulte con un  
Centro de  
Vacunación  
Internacional

[www.msssi.gob.es/cvi](http://www.msssi.gob.es/cvi)

901 400 100



MINISTERIO  
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES  
E IGUALDAD

SECRETARÍA GENERAL  
DE SANIDAD Y CONSUMO

DIRECCIÓN GENERAL  
DE SALUD PÚBLICA,  
CALIDAD E INNOVACIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL  
DE SANIDAD EXTERIOR